

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Brevdato

21.12.2012

Forsikringsselskabets navn

pensionskassen for portører

Overskrift

Opdatering af markedsværdiinvaliditet

Resume

Anmeldelsen vedrører de invalideforudsætninger, som pensionskassen anvender ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Forudsætningerne ændres i forhold til tidligere anmeldelse

Lovgrundlaget

Anmeldelsen vedrører § 20 stk. 1, nr. 6 i lov om finansiel virksomhed

Ikræfttrædelse

Anmeldelsen anvendes første gang i årsregnskabet for 2012

Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold

Denne anmeldelse ændrer anmeldelse af 22.12.2010: "Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi samt anvendelse af bonuspotentiale på fripolicydelser"

Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang

Anmeldelsen vedrører forsikringsklasse I.

Opdateret invalideintensitet, som indgår i beregning af pensionshensættelser til markedsværdi fremgår af nyt "Bilag 1 til grundlaget PKMV: Risikoelementer", som er vedlagt.

De anmeldte parametre er gældende, indtil andet anmeldes.

Invalideintensiteten i pensionskassen er bestemt ved et Gompertz-Makeham udtryk.

Til bestemmelse af bedste skøn for invalideintensiteten er benyttet pensionskassens egne data samt data fra pensionsordningen for portører i PenSam Liv Tradition fra årene 2007-2010. Kunderne i sidstnævnte gruppe har samme beskæftigelse som medlemmerne i pensionskassen, og det vurderes derfor at være rimeligt at anvende denne gruppe til at styrke datagrundlaget, som anvendes til at vurdere det underliggende niveau for invaliditet blandt pensionskassens medlemmer.

Samme data ligger til grund for bestandens 2. ordens priser i 2012, og det via risikoresultaterne i løbet af 2012 vurderet, at det er rimeligt at lægge dette data til grund for fastsættelse af bedste skøn.

Der er ikke konstateret signifikante forskelle i invalideniveauerne blandt mænd og kvinder, hvorfor bedste skøn er ens for mænd og kvinder.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne

Der er ingen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne.

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne

Der er ingen økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet

Der er ingen juridiske konsekvenser for pensionskassen.

Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for forsikringsselskabet

Den samlede økonomiske konsekvens ved ændring af dødelighedsparametrene er angivet i nedenstående tabel:

	Ændring i mio. kr.
Garanterede ydelser	+2
Bonuspotentialer på fremtidige præmier	0
Bonuspotentialer på fripolicydelser	0
Værdiregulering	+2


Konsekvenserne er beregnet med bestand og rentekurve pr. 31.10.2012. De samlede pensionshensættelser stiger således med 2 mio. kr.

Navn
Angivelse af navn

Helen Kobæk

Dato og underskrift

21.12.2012




Navn
Angivelse af navn

Peter Østergaard

Dato og underskrift

21.12.2012



Navn
Angivelse af navn

Carsten Strøh

Dato og underskrift

21.12.2012



Bilag 1 til grundlaget PKMV: Risikoelementer

De anmeldte parametre er gældende indtil andet anmeldes.

1. Risikoelementer

x betegner fyldt alder

2. Dødelighed

Dødelighed (observeret, nuværende) for en invalid mand:

Fremgår af tabel 1A.

Dødelighed (observeret, nuværende) for en invalid kvinde:

Fremgår af tabel 1B.

Dødelighed (observeret, nuværende) for en ikke-invalid mand:

Fremgår af tabel 2A.

Dødelighed (observeret, nuværende) for en ikke-invalid kvinde:

Fremgår af tabel 2B.

3. Invaliditet

for en mand:

$$\mu^{ai}(x) = \begin{cases} a1_m + 10^{b1_m + c1_m x - 10} & \text{for } x < 60 \\ a2_m + 10^{b2_m + c2_m x - 10} & \text{for } 60 \leq x < 65 \\ a3_m + 10^{b3_m + c3_m x - 10} & \text{for } x \geq 65 \end{cases}$$

for en kvinde:

$$\mu^{ai}(x) = \begin{cases} a1_k + 10^{b1_k + c1_k x - 10} & \text{for } x < 60 \\ a2_k + 10^{b2_k + c2_k x - 10} & \text{for } 60 \leq x < 65 \\ a3_k + 10^{b3_k + c3_k x - 10} & \text{for } x \geq 65 \end{cases}$$

Parameterverdier fremgår af tabel 3A og 3B.

4. Kollektive ægtefællepensioner

4.1 Risikoelementer for kollektiv ægtefællepension med mandlig forsørger

$$\gamma_x = 0,15 \cdot 10^{\frac{(x-28)^2}{28(x-15)}} \quad \text{for } x > 15; \quad \gamma_x = 0 \quad \text{for } x \leq 15$$
$$\sigma_x = 0,012 \cdot 10^{\frac{(x-15)^2}{1600}} \quad \text{for } x > 15; \quad \sigma_x = 0 \quad \text{for } x \leq 15$$

$$\lambda_x = 0,615 \cdot x + 8$$

$$s_x = \left(0,21 - \frac{1}{x-10}\right) \cdot x$$

4.2 Risikoelementer for kollektiv ægtefællepension med kvindelig forsørger

$$\gamma_x = 0,13 \cdot 10 \frac{(x-24)^2}{20(x-12)} \quad \text{for } x > 12; \quad \gamma_x = 0 \text{ for } x \leq 12$$

$$\sigma_x = 0,02 \cdot 10 \frac{(x-12)^2}{2100} \quad \text{for } x > 12; \quad \sigma_x = 0 \text{ for } x \leq 12$$

$$\lambda_x = 0,915 \cdot x + 4$$

$$s_x = \left(0,21 - \frac{1}{x-7}\right) \cdot x$$

5. Kollektive børnerenter

5.1. Risikoelementer for kollektive børnerenter med mandlig forsørger

"Faderskabsintensitet"

$$c_x = 0,15 \cdot 10 \frac{(x-28)^2}{11(x-15)} \quad \text{for } x > 15; \quad c_x = 0 \text{ for } x \leq 15$$

5.2. Risikoelementer for kollektive børnerenter med kvindelig forsørger

"Moderskabsintensitet"

$$c_x = 0,18 \cdot 10 \frac{(x-24)^2}{7(x-12)} \quad \text{for } x > 12; \quad c_x = 0 \text{ for } x \leq 12$$

Tabel 1A: Intensitet for mænd for overgang fra invalid til død (observeret, nuværende niveau):

alder	mu
1	0,002654301
2	0,001525945
3	0,000792162
4	0,000726373
5	0,00079136
6	0,00074004
7	0,000777445
8	0,000782308
9	0,00100252
10	0,001287638
11	0,001589878
12	0,001884274
13	0,002085418
14	0,002103297
15	0,002433299
16	0,003029801
17	0,003708686
18	0,004456273
19	0,005441877
20	0,006269468
21	0,00711383
22	0,008494505
23	0,009551597
24	0,009957032
25	0,009750464
26	0,008755647
27	0,0072717
28	0,006127765
29	0,005435542
30	0,00513513
31	0,005033748
32	0,005002854
33	0,004997225
34	0,004994083
35	0,005190517
36	0,005817511
37	0,006849701
38	0,007995563
39	0,009333524
40	0,010762336
41	0,011499943
42	0,011889444
43	0,012412081
44	0,012787995
45	0,013113275
46	0,013780753
47	0,014583035
48	0,015321393
49	0,016383875
50	0,017692092
51	0,018832293
52	0,020497763
53	0,022044246
54	0,023421197
55	0,024674002

56	0,025696374
57	0,026347339
58	0,026996247
59	0,027877754
60	0,028736218
61	0,030426496
62	0,032045906
63	0,033750333
64	0,035340791
65	0,036897504
66	0,038410732
67	0,039867201
68	0,041641293
69	0,043650899
70	0,046252747
71	0,049433284
72	0,053043205
73	0,05707825
74	0,06209044
75	0,068182926
76	0,074883289
77	0,082187083
78	0,090261598
79	0,098128316
80	0,105983788
81	0,116430395
82	0,127516296
83	0,139722225
84	0,153918761
85	0,170085837
86	0,18711105
87	0,205585176
88	0,22481699
89	0,243613128
90	0,262460568
91	0,281721014
92	0,301753929
93	0,322473637
94	0,344443093
95	0,366798965
96	0,389029134
97	0,410868171
98	0,432040187
99	0,452268051
100	0,471283384
101	0,505263333
102	0,539196499
103	0,57277686
104	0,605710713
105	0,637726471
106	0,668582917
107	0,698075443
108	0,727159964
109	0,754415597
110	0,779652155

Tabel 1B: Intensitet for kvinder for overgang fra invalid til død (observeret, nuværende niveau):

alder	mu
1	0,008339655
2	0,007415013
3	0,008373961
4	0,005997741
5	0,004615882
6	0,003645277
7	0,00288878
8	0,002180499
9	0,001915141
10	0,001917793
11	0,001943667
12	0,002065748
13	0,002343995
14	0,002615351
15	0,002941422
16	0,003522927
17	0,00415881
18	0,004986052
19	0,005652593
20	0,006502165
21	0,007030117
22	0,007278586
23	0,007231623
24	0,006642563
25	0,005622247
26	0,004471381
27	0,003726166
28	0,003095957
29	0,003527157
30	0,003949701
31	0,004519616
32	0,005183228
33	0,005735905
34	0,005988581
35	0,00620966
36	0,006575975
37	0,007090993
38	0,008158394
39	0,009727063
40	0,011682571
41	0,012555241
42	0,013190989
43	0,013667541
44	0,013843736
45	0,01390452
46	0,014114129
47	0,014495781
48	0,014639812
49	0,014954638
50	0,015089641
51	0,015266435
52	0,015453917
53	0,015743018
54	0,016043631

55	0,016367937
56	0,01649022
57	0,016525338
58	0,016450987
59	0,016209235
60	0,016022224
61	0,016678518
62	0,017370289
63	0,018223542
64	0,019164977
65	0,020263878
66	0,021559043
67	0,022623987
68	0,02370441
69	0,024998132
70	0,026362957
71	0,02803452
72	0,030589402
73	0,032972668
74	0,035503049
75	0,038656317
76	0,042269417
77	0,046441549
78	0,051516352
79	0,056786959
80	0,062611183
81	0,06915565
82	0,07536797
83	0,081631875
84	0,088326735
85	0,096826558
86	0,106932866
87	0,119405992
88	0,133624017
89	0,149168562
90	0,16555964
91	0,183297009
92	0,201582988
93	0,220966774
94	0,241839934
95	0,263074013
96	0,285168815
97	0,307962195
98	0,331258427
99	0,354831081
100	0,378427955
101	0,411399349
102	0,445179154
103	0,479471555
104	0,51396234
105	0,548329967
106	0,582257165
107	0,615442245
108	0,648468847
109	0,680269741
110	0,710463889

Tabel 2A: Intensitet for mænd for overgang fra ikke-invalid til død (observeret, nuværende niveau):

alder	mu
1	0,000241837
2	0,000139031
3	7,2175E-05
4	6,61808E-05
5	7,21018E-05
6	6,7426E-05
7	7,0834E-05
8	7,12771E-05
9	9,13409E-05
10	0,000117318
11	0,000144856
12	0,000171679
13	0,000190005
14	0,000191634
15	0,000221701
16	0,000276049
17	0,000337903
18	0,000406017
19	0,000495817
20	0,000571219
21	0,00064815
22	0,000773946
23	0,000870259
24	0,000907198
25	0,000888378
26	0,000797738
27	0,000662534
28	0,000558309
29	0,000495239
30	0,000467868
31	0,000458631
32	0,000455817
33	0,000455304
34	0,000455017
35	0,000472915
36	0,000530041
37	0,000624085
38	0,000728486
39	0,00085039
40	0,000980571
41	0,001101452
42	0,001197095
43	0,001313739
44	0,001422868
45	0,001533807
46	0,001694455
47	0,001884961
48	0,002081853
49	0,00234027
50	0,002656599
51	0,002972675
52	0,003401325
53	0,003845337
54	0,004294827
55	0,004756348

56	0,005207189
57	0,00561262
58	0,006045465
59	0,006562685
60	0,007111133
61	0,00795169
62	0,008844358
63	0,009836896
64	0,010877837
65	0,011993599
66	0,013185341
67	0,014452427
68	0,015941732
69	0,017647807
70	0,019747919
71	0,022288946
72	0,025257251
73	0,028702071
74	0,032972629
75	0,038237609
76	0,044349248
77	0,05140332
78	0,059617928
79	0,068447007
80	0,078070294
81	0,087086418
82	0,09684728
83	0,107751894
84	0,120528197
85	0,135239306
86	0,151067798
87	0,168539593
88	0,187144451
89	0,205914152
90	0,225261646
91	0,245516177
92	0,267024729
93	0,289754672
94	0,314261655
95	0,339812771
96	0,365958132
97	0,392454628
98	0,419033538
99	0,44540822
100	0,471283384
101	0,505263333
102	0,539196499
103	0,57277686
104	0,605710713
105	0,637726471
106	0,668582917
107	0,698075443
108	0,727159964
109	0,754415597
110	0,779652155

Tabel 2B: Intensitet for kvinder for overgang fra ikke-invalid til død (observeret, nuværende niveau):

alder	Mu
1	0,000347385
2	0,000308869
3	0,000348814
4	0,000249833
5	0,000192273
6	0,000151842
7	0,000120331
8	9,08277E-05
9	7,97744E-05
10	7,98848E-05
11	8,09626E-05
12	8,60478E-05
13	9,76381E-05
14	0,000108941
15	0,000122524
16	0,000146746
17	0,000173233
18	0,000207692
19	0,000235456
20	0,000270845
21	0,000292836
22	0,000303186
23	0,00030123
24	0,000276693
25	0,000234192
26	0,000186253
27	0,000155212
28	0,000128961
29	0,000146922
30	0,000164523
31	0,000188263
32	0,000215905
33	0,000238927
34	0,000249452
35	0,000258661
36	0,000273919
37	0,000295372
38	0,000339834
39	0,000405177
40	0,000486632
41	0,000573453
42	0,000660633
43	0,000750557
44	0,000833598
45	0,000918056
46	0,001021828
47	0,001150735
48	0,001274322
49	0,001427348
50	0,001579221
51	0,001751911
52	0,001944567
53	0,002172114
54	0,00242721
55	0,002715244

56	0,002999518
57	0,003295987
58	0,003597802
59	0,003887031
60	0,004212971
61	0,004578807
62	0,004978875
63	0,005453637
64	0,005988127
65	0,006610503
66	0,007342953
67	0,008045252
68	0,008800937
69	0,009690286
70	0,010669705
71	0,011846244
72	0,013495464
73	0,015187986
74	0,017074226
75	0,019409981
76	0,02215951
77	0,025419668
78	0,029439982
79	0,0338821
80	0,039003437
81	0,044111934
82	0,04922579
83	0,054593772
84	0,060485734
85	0,067894208
86	0,076776249
87	0,087784785
88	0,100590069
89	0,114980803
90	0,130671224
91	0,148135216
92	0,16681468
93	0,187234043
94	0,209827935
95	0,23371721
96	0,259413293
97	0,286856736
98	0,315945396
99	0,346532684
100	0,378427955
101	0,411399349
102	0,445179154
103	0,479471555
104	0,51396234
105	0,548329967
106	0,582257165
107	0,615442245
108	0,648468847
109	0,680269741
110	0,710463889

Tabel 3A: Parameterværdier vedr. intensiteten for mænd for overgang fra aktiv til invalid: μ^{ai}

$a1_m$	$b1_m$	$c1_m$	$a2_m$	$b2_m$	$c2_m$	$a3_m$	$b3_m$	$c3_m$
- 0,00045	5,3135	0,0512	- 0,005	17,0000	-0,1427	-1	10	0

Tabel 3B: Parameterværdier vedr. intensiteten for kvinder for overgang fra aktiv til invalid: μ^{ai}

$a1_k$	$b1_k$	$c1_k$	$a2_k$	$b2_k$	$c2_k$	$a3_k$	$b3_k$	$c3_k$
- 0,00045	5,3135	0,0512	- 0,005	17,0000	-0,1427	-1	10	0